

WYBRANE ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z ISO

dr Piotr Wąsiewicz

- W języku logiki I rzędu czyli języku predykatów napisać:
 "Istnieje studentka, która kocha cały czas pewnego chłopaka."
 "Każda dziewczyna kocha się czasami w jakimś chłopaku."

ROZWIĄZANIE:

$$\exists x \forall t \exists y (studentka(x) \wedge chopak(y) \wedge czas(t) \wedge kocha(x, y, t))$$

$$\forall x \exists t \exists y (dziewczyna(x) \wedge chopak(y) \wedge czas(t) \Rightarrow kocha(x, y, t))$$

- Omówić zasadę wnioskowania w przód i wstecz.

ROZWIĄZANIE:

Podane jest w książce prof. J.J. Mulawki "Systemy Ekspertowe" WNT 1996.

- Korzystając z teorii Dempstera-Shafera obliczyć rozkład prawdopodobieństwa dla połączenia dwóch rozkładów:

$$\{m(\{x_1, x_2, x_3\}) = \frac{2}{5}, m(\{x_1, x_3, x_4\}) = \frac{1}{5}, m(\{x_1, x_2, x_4\}) = \frac{2}{5}\}$$

$$\{m(\{x_3, x_4\}) = \frac{1}{4}, m(\{x_1, x_4\}) = \frac{1}{4}, m(\{x_2\}) = \frac{1}{2}\}$$

oraz wartości funkcji przekonania *Bel* i wyobraźności *Pl* dla wszystkich trzech rozkładów.

ROZWIĄZANIE:

$\{x_1, x_2, x_3\}$ $\frac{2}{5}$	$\{x_3\}$ $\frac{2}{20}$	$\{x_1\}$ $\frac{2}{20}$	$\{x_2\}$ $\frac{4}{20}$
$\{x_1, x_3, x_4\}$ $\frac{1}{5}$	$\{x_3, x_4\}$ $\frac{1}{20}$	$\{x_1, x_4\}$ $\frac{1}{20}$	\emptyset $\frac{2}{20}$
$\{x_1, x_2, x_4\}$ $\frac{2}{5}$	$\{x_4\}$ $\frac{2}{20}$	$\{x_1, x_4\}$ $\frac{2}{20}$	$\{x_2\}$ $\frac{4}{20}$
0	$\{x_3, x_4\}$ $\frac{1}{4}$	$\{x_1, x_4\}$ $\frac{1}{4}$	$\{x_2\}$ $\frac{1}{2}$

$$\sum_{A \cap B = \emptyset} m_1(A)m_2(B) = \frac{2}{20}; \quad (m_1 \oplus m_2)(\{x_2\}) = \frac{\frac{4}{20} + \frac{4}{20}}{1 - \frac{2}{20}} = \frac{\frac{8}{20}}{\frac{18}{20}} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9};$$

$$(m_1 \oplus m_2)(\{x_1, x_4\}) = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{18}{20}} = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}; \quad (m_1 \oplus m_2)(\{x_3, x_4\}) = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{18}{20}} = \frac{1}{18};$$

$$m(\{x_1\}) = \frac{\frac{2}{20}}{\frac{18}{20}} = \frac{1}{9}; \quad m(\{x_3\}) = \frac{\frac{2}{20}}{\frac{18}{20}} = \frac{1}{9}; \quad m(\{x_4\}) = \frac{\frac{2}{20}}{\frac{18}{20}} = \frac{1}{9};$$

Dla pierwszego rozkładu:

$$Bel(\{x_1, x_2, x_3\}) = \frac{2}{5}; \quad Bel(\{x_1, x_3, x_4\}) = \frac{1}{5}; \quad Bel(\{x_1, x_2, x_4\}) = \frac{2}{5};$$

$$Pl(\{x_1, x_2, x_3\}) = 1; \quad Pl(\{x_1, x_3, x_4\}) = 1; \quad Pl(\{x_1, x_2, x_4\}) = 1;$$

Dla drugiego rozkładu:

$$Bel(\{x_3, x_4\}) = \frac{1}{4}; \quad Bel(\{x_1, x_4\}) = \frac{1}{4}; \quad Bel(\{x_2\}) = \frac{1}{2};$$

$$Pl(\{x_3, x_4\}) = m(\{x_3, x_4\}) + m(\{x_1, x_4\}) = \frac{1}{2}; \quad Pl(\{x_1, x_4\}) = \frac{1}{2}; \quad Pl(\{x_2\}) = \frac{1}{2};$$

Dla trzeciego policzonego rozkładu:

$$Bel(\{x_2\}) = \frac{4}{9}; \quad Bel(\{x_1, x_4\}) = m(\{x_1\}) + m(\{x_4\}) + m(\{x_1, x_4\}) = \frac{7}{18};$$

$$Bel(\{x_3, x_4\}) = m(\{x_3\}) + m(\{x_4\}) + m(\{x_3, x_4\}) = \frac{5}{18}; \quad Bel(\{x_1\}) = \frac{1}{9};$$

$$Bel(\{x_3\}) = \frac{1}{9}; \quad Bel(\{x_4\}) = \frac{1}{9};$$

$$Pl(\{x_2\}) = \frac{4}{9}; \quad Pl(\{x_1, x_4\}) = \frac{4}{9}; \quad Pl(\{x_3, x_4\}) = \frac{4}{9};$$

$$Pl(\{x_3\}) = m(\{x_3\}) + m(\{x_3, x_4\}) = \frac{1}{6}; \quad Pl(\{x_1\}) = m(\{x_1\}) + m(\{x_1, x_4\}) = \frac{5}{18};$$

$$Pl(\{x_4\}) = m(\{x_4\}) + m(\{x_1, x_4\}) + m(\{x_3, x_4\}) = \frac{1}{3};$$

4. Z danej tablicy warunkowo-działaniowej podanej poniżej wyprowadzić bazę reguł o postaci (atrybut₁, wartość) ∧ (atrybut₂, wartość) = (atrybut działaniowy, wartość). Wypisać wszystkie (razem 11) relacje nierozróżnialności pomiędzy poszczególnymi x_i dla $i \in \{1..6\}$ np. $x_1 \widetilde{\{z\}} x_2$ i podać wszystkie klasyfikacje określone przez relacje nierozróżnialności np. $\{z\}^* = \{\{x_1, x_2, x_5\}, \{x_6\}, \{x_3, x_4\}\}$. Następnie podać, które zbiory atrybutów są zależne od innych i wyznaczyć dla $\mathcal{Z} = \{z\}^*$, $P = \{x, y\}$ aproksymację dolną $\underline{P}\mathcal{Z}$ oraz aproksymację górną $\overline{P}\mathcal{Z}$ oraz wyprowadzić reguły pewne.

	Atrybuty warunkowe		Atrybut działaniowy
	x	y	z
x_1	P	F	0
x_2	N	T	0
x_3	N	T	1
x_4	P	F	1
x_5	N	F	0
x_6	N	T	2

ROZWIĄZANIE:

$$x_1, x_4 : (x, P) \wedge (y, F) = (z, 0) \vee (z, 1)$$

$$x_2, x_5 : (x, N) = (z, 0)$$

$$x_3, x_6 : (x, N) \wedge (y, T) = (z, 1) \vee (z, 2)$$

Tablica (symetryczna) wszystkich relacji nierozróżnialności postaci np.: $x_1 \widetilde{\{z\}} x_2 = x_2 \widetilde{\{z\}} x_1$, $x_2 \widetilde{\{x, z\}} x_5 = x_5 \widetilde{\{x, z\}} x_2$ jest przedstawiona poniżej.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_6	$\{\phi\}$	$\{x, y\}$	$\{x, y\}$	$\{\phi\}$	$\{x\}$
x_5	$\{y, z\}$	$\{x, z\}$	$\{x\}$	$\{y\}$	
x_4	$\{x, y\}$	$\{\phi\}$	$\{z\}$		
x_3	$\{\phi\}$	$\{x, y\}$			
x_2	$\{z\}$				

$$\mathcal{Z} = \{z\}^* = \{\{x_1, x_2, x_5\}, \{x_3, x_4\}, \{x_6\}\}$$

$$P^* = \{x, y\}^* = \{\{x_1, x_4\}, \{x_2, x_3, x_6\}, \{x_5\}\}$$

$$\underline{P}\mathcal{Z} = \{x_5\}$$

$$\overline{P}\mathcal{Z} = \{\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}, \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_6\}, \{x_2, x_3, x_6\}\}$$

Reguły pewne z $\underline{P}\mathcal{Z}$:

$$x_5 : (x, N) \wedge (y, F) = (z, 0)$$

Reguły możliwe to dopełnienie reguł pewnych do pełnego ich zbioru:

$$x_1, x_4 : (x, P) \wedge (y, F) = (z, 0) \vee (z, 1)$$

$$x_2 : (x, N) \wedge (y, T) = (z, 0)$$

$$x_3 : (x, N) \wedge (y, T) = (z, 1)$$

5. Dla podanych dalej relacji rozmytych podać trzy kompozycje (złożenia) $\mu_1 \cdot \mu_2$, $\mu_2 \cdot \mu_2^T$ oraz $\mu_2^T \cdot \mu_2$.

$$\mu_1 = \begin{array}{|c|c|} \hline & w \\ \hline a & 0.03 \\ \hline b & 0.98 \\ \hline c & 0.63 \\ \hline d & 0.32 \\ \hline \end{array}, \mu_2 = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & z & x & y & v \\ \hline a & 0.32 & 0.85 & 0.45 & 0.21 \\ \hline b & 0.09 & 0.75 & 0.34 & 0.23 \\ \hline c & 0.21 & 0.23 & 0.12 & 0.34 \\ \hline d & 0.10 & 0.54 & 0.76 & 0.89 \\ \hline \end{array}$$

ROZWIĄZANIE:

$$\begin{aligned} \mu_1 \circ \mu_2(z) &= \max_{u_1}(\min(\mu_1(u_1), \mu_2(u_1, z))) = \\ &= \max(\min(\mu_1(a), \mu_2(a, z)), \min(\mu_1(b), \mu_2(b, z)), \min(\mu_1(c), \mu_2(c, z)), \\ &\min(\mu_1(d), \mu_2(d, z))) = \\ &= \max(\min(0.03, 0.32), \min(0.98, 0.09), \min(0.63, 0.21), \min(0.32, 0.10)) = \\ &= \max(0.03, 0.09, 0.21, 0.10) = 0.21 \end{aligned}$$

$$\mu_1 \circ \mu_2(x) = \max(0.03, 0.75, 0.23, 0.32) = 0.75$$

$$\mu_1 \circ \mu_2(y) = \max(0.03, 0.34, 0.12, 0.32) = 0.34$$

$$\mu_1 \circ \mu_2(v) = \max(0.03, 0.23, 0.34, 0.32) = 0.34$$

$$\begin{aligned} \mu_2 \circ \mu_2^T(a, b) &= \max_{u_2}(\min(\mu_1(a, u_2), \mu_2(u_2, b))) = \\ &= \max(\min(0.32, 0.09), \min(0.85, 0.75), \min(0.45, 0.34), \min(0.21, 0.23)) = \\ &= \max(0.09, 0.75, 0.34, 0.21) = 0.75 \end{aligned}$$

$$\mu_2 \circ \mu_2^T(a, c) = \mu_2 \circ \mu_2^T(c, a) = \max(0.21, 0.23, 0.12, 0.21) = 0.23$$

$$\mu_2 \circ \mu_2^T(a, d) = \mu_2 \circ \mu_2^T(d, a) = \max(0.10, 0.54, 0.45, 0.21) = 0.54$$

$$\mu_2 \circ \mu_2^T(b, c) = \mu_2 \circ \mu_2^T(c, b) = \max(0.09, 0.23, 0.12, 0.23) = 0.23$$

$$\mu_2 \circ \mu_2^T(b, d) = \mu_2 \circ \mu_2^T(d, b) = \max(0.09, 0.54, 0.34, 0.23) = 0.54$$

$$\mu_2 \circ \mu_2^T(c, d) = \mu_2 \circ \mu_2^T(d, c) = \max(0.10, 0.23, 0.12, 0.34) = 0.34$$

$$\mu_2^T \circ \mu_2(z, x) = \mu_2^T \circ \mu_2(x, z) = \max(0.32, 0.09, 0.21, 0.10) = 0.32$$

$$\mu_2^T \circ \mu_2(z, y) = \mu_2^T \circ \mu_2(y, z) = \max(0.32, 0.09, 0.12, 0.10) = 0.32$$

$$\mu_2^T \circ \mu_2(z, v) = \mu_2^T \circ \mu_2(v, z) = \max(0.21, 0.09, 0.21, 0.10) = 0.21$$

$$\mu_2^T \circ \mu_2(x, y) = \mu_2^T \circ \mu_2(y, x) = \max(0.45, 0.34, 0.12, 0.54) = 0.54$$

$$\mu_2^T \circ \mu_2(x, v) = \mu_2^T \circ \mu_2(v, x) = \max(0.21, 0.23, 0.23, 0.54) = 0.54$$

$$\mu_2^T \circ \mu_2(y, v) = \mu_2^T \circ \mu_2(v, y) = \max(0.21, 0.23, 0.12, 0.76) = 0.76$$

$$\mu_2 \circ \mu_2^T = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & a & b & c & d \\ \hline a & 0.85 & 0.75 & 0.23 & 0.54 \\ \hline b & 0.75 & 0.75 & 0.23 & 0.54 \\ \hline c & 0.23 & 0.23 & 0.34 & 0.34 \\ \hline d & 0.54 & 0.54 & 0.34 & 0.89 \\ \hline \end{array} \quad \mu_2^T \circ \mu_2 = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & z & x & y & v \\ \hline z & 0.32 & 0.32 & 0.32 & 0.21 \\ \hline x & 0.32 & 0.85 & 0.54 & 0.54 \\ \hline y & 0.32 & 0.54 & 0.76 & 0.76 \\ \hline v & 0.21 & 0.54 & 0.76 & 0.89 \\ \hline \end{array}$$

6. Omówić budowę i zasadę konstruowania systemów ekspertowych.

ROZWIĄZANIE:

Podane jest w książce prof. J.J. Mulawki "Systemy Ekspertowe" WNT 1996.